

IMUNOBIOLÓGICOS NAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS

BIOLÓGICO	MECANISMO DE AÇÃO	APRESENTAÇÃO	VIA ADMINISTRAÇÃO	DOSE INDUÇÃO	DOSE DE MANUTENÇÃO	OTIMIZAÇÃO DE DOSE	DISPONÍVEL SUS	DOENÇA DE CROHN	RETICOLITE ULCERATIVA	UTILIZADO NAS MEIS	PROGRAMA DO LABORATÓRIO
INFLIXIMABE - Remicade®	Anti-TNF	100 mg = 1 ampola	Endovenosa	5 mg/kg por dose - semana zero - semana dois - semana seis	0,5mg/kg/dose A cada 8 semanas	0,5 mg/dose a cada 4 semanas	X	X	X	X	Essencial 0800-774-4300
ADALIMUMABE - Humira®	Anti-TNF	40 mg Caneta ou seringa	Subcutânea	- semana zero: 4 ampolas de 40 mg - semana 2: 2 ampolas	40 mg a cada 14 dias	40 mg/ semanal	X	X	X	X	Humanizar 0800-703-0127
CERTOLIZUMABE - Cimzia®	Anti-integrina	200 mg = 1 ampola	Subcutânea	- semana 0: 2 ampolas - semana 2: 2 ampolas - semana 4: 2 ampolas	2 ampolas de 200 mg a cada 28 dias	Não contempla	X		X	X	Sempre em frente 0800-7712550
USTEKINUMABE - Stelara®	Anti-TNF	EV=130mg SC= 90 mg	1ª dose: Endovenosa Demais doses: subcutânea	ENDOVENOSA <55 kg: 2 ampolas de 130 mg 55 a 85kg: 3 ampolas > 85 kg: 4 amp	SUBCUTÂNEO - semana 8: 1 ampola de 90 mg - semana 16: resposta? SIM: manter de 12/12 semanas. NÃO: OTIMIZAR!	90 mg 1 ampola cada 8 semanas		X	X		Essencial 0800-774-4300
VEDOLIZUMABE - Entyvio®	Anti-interleucina 12 e 23	300 mg = 1 ampola	Endovenosa	300 mg -semana zero -semana 2 -semana 6 -semana 10 (apenas Crohn)	300 mg a cada 8 semanas	300 mg a cada 4 semanas		X	X		Entre nós 0800-882-1883
GOLIMUMABE - Simponi®	Anti-TNF alfa	50 mg/0,5ml	Subcutânea	Peso > 80 kg: - semana zero: 200 mg - semana 2: 100 mg - semana Peso < 80kg: - semana zero: 200 mg - semana 2: 100 mg	Peso > 80 kg: 100 mg a cada 4 semanas Peso > 80 kg: 50 mg a cada 4 semanas			X	X		Essencial 0800-774-4300
CITRATO DE TOFACITINIBE - Xeljanz®	Inibidor da enzima Jak quinase	5 mg comprimido 10 mg comprimido	Oral	10 mg 1 comp manhã e 1 comp a noite por 8 semanas	5 mg 1 comp manhã ou noite (a partir da 9ª semana)	10 mg 1 comp manhã ou noite			X		Dra. Jacqueline De Marchi CRM: 6343 RQE: 3206/5540/6221